

 Carlo Poma  Regione Lombardia ASST Mantova	INFORMATIVA Valutazione delle Gastroenterorragie <i>(cod. Min. 0192044)</i>	MOD377pPOL10MQ07 Data 07/04/2025 Rev. 4 Pagina 1 di 2
---	---	---

SCINTIGRAFIA PER RICERCA DI SANGUINAMENTO È un esame di medicina nucleare che permette di individuare la sede di un sanguinamento attivo nel tratto gastro-intestinale. L'esame utilizza globuli rossi marcati con un radiofarmaco che, una volta reiniettati nel paziente, permettono di visualizzare eventuali fuoriuscite di sangue nell'intestino.

PRINCIPALI INDICAZIONI L'esame è indicato in caso di:

- Sanguinamento gastro-intestinale in fase attiva
- Ricerca della sede di sanguinamento occulto
- Melena o rettorragia di origine non determinata
- Anemizzazione acuta di sospetta origine gastro-intestinale

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non è necessario il digiuno
- Può continuare ad assumere i suoi farmaci abituali
- Se sta assumendo ferro per via orale, deve sospenderlo 5 giorni prima dell'esame
- Portare con sé Documentazione clinica recente, Esami del sangue recenti, Eventuali endoscopie o altri esami radiologici precedenti, Lista dei farmaci assunti abitualmente.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Prima fase:
 - Verrà prelevata una piccola quantità del suo sangue
 - I globuli rossi verranno marcati con il radiofarmaco in laboratorio
 - La procedura di marcatura richiede circa 30 minuti
2. Seconda fase:
 - I globuli rossi marcati verranno reiniettati per via endovenosa
 - Inizierà subito l'acquisizione delle immagini
 - Lei sarà posizionato sul lettino della gamma-camera
 - Le immagini verranno acquisite a intervalli regolari per alcune ore
 - È importante rimanere il più possibile immobili durante le acquisizioni

DURATA DELL'ESAME

- La durata complessiva è variabile, da 2 a 24 ore
- Le acquisizioni vengono ripetute fino all'individuazione del sanguinamento o all'esclusione di sanguinamento attivo
- Tra un'acquisizione e l'altra potrà riposare in una sala d'attesa dedicata

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Informi il personale se:
 - È in gravidanza o sospetta di esserlo
 - Sta allattando
 - Ha allergie note
 - Ha difficoltà a rimanere immobile
 - Ha recentemente effettuato trasfusioni di sangue

 Carlo Poma  Regione Lombardia ASST Mantova	INFORMATIVA Valutazione delle Gastroenterorragie (cod. Min. 0192044)	MOD377pPOL10MQ07 Data 07/04/2025 Rev. 4 Pagina 2 di 2
--	--	---

DOPO L'ESAME

- Potrà riprendere le normali attività
- Non ci sono restrizioni alimentari
- È consigliabile bere abbondantemente
- Per 24 ore è consigliabile limitare i contatti stretti prolungati con bambini e donne in gravidanza

IMPORTANTE: L'esame può essere eseguito anche in urgenza, 24 ore su 24, in caso di sanguinamento acuto.

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti, può contattare il nostro reparto.