PREPARAZIONE CON PLENVU (1 litro preparazione + 1 litro di liquidi chiari)

il giorno prima dell'esame:

- non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo)
- si può consumare una colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. Si può bere nel pomeriggio ma la cena non è permessa. Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa. Il giorno dell'esame non è permessa colazione.

il giorno dell'esame non è permessa colazione, solo liquidi chiari (tè, acqua, camomilla)

Per il successo dell'esame, bisogna acquistare in farmacia **UNA** confezione di PLENVU:

Colonscopia programmata dalle ore 8 alle 10: il giorno prima dell'esame ore 20.00-20.30 bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi la dose 1 di PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare pausa di almeno un'ora e bere LENTAMENTE la dose 2 di PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Bere ulteriori liquidi chiari se sente lo stimolo della sete. La mattina è permesso bere acqua fino a due ore prima dell'inizio dell'esame.

Colonscopia programmata dopo le ore 10: il giorno prima dell'esame ore 20.00-20.30 bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi la dose 1 di PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Il giorno stesso dell'esame: 4 ore prima dell'inizio dell'esame è suggerito bere uno o due bicchieri di acqua/liquidi chiari(thè o camomilla). Dopo 10 minuti circa bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi la dose 2 PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Bere ulteriori liquidi chiari se sente lo stimolo della sete. Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

Colonscopia programmata dopo le ore 14: il giorno stesso dell'esame non è permessa la colazione. Ore 07:00, bere LENTAMENTE e a piccoli sorsi la dose 1 di PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare pausa di almeno un'ora e bere LENTAMENTE la dose 2 di PLENVU e almeno ½ litro di liquidi chiari nell'arco di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete. Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

Come preparare le due dosi di **PLENVU**:

Dose 1



La dose ricostituita, più gli ulteriori 500ml di liquidi chiari, devono essere assunti in non meno di 60 minuti. È possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Tra il termine dell'assunzione della dose 1 e l'inizio dell'assunzione della dose 2 deve passare almeno 1 ora.

Dose 2



La dose ricostituita, più gli ulteriori 500ml di liquidi chiari, devono essere assunti in non meno di 60 minuti. È possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostituita con i liquidi chiari. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

NOTA BENE: NON INVERTIRE la sequenza delle dosi

AVVERTENZE Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di PLENVU in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

CONTROINDICAZIONI: PLENVU è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi = favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato), questi pazienti dovranno utilizzare il SELG-ESSE.

Il giorno dell'esame il paziente deve essere accompagnato perché dopo l'esame non potrà guidare alcun veicolo.