

**Concorso per Infermiere ASST Mantova**  
**22/02/2022 Prova SCRITTA - Tema A**

1. Durante l'esame obiettivo di una persona affetta da Broncopneumopatia cronica ostruttiva, viene valutata anche la presenza di:

- a) caratteristiche delle urine, indice di massa corporea, deficit del sensorio
- b) temperatura corporea, diuresi, modello di alimentazione, deficit del sensorio
- c) bilancio idro-elettrico, caratteristiche delle urine, cianosi periferica, indice di massa corporea
- d) cianosi centrale, dita ippocratiche, deficit del sensorio, utilizzo dei muscoli accessori della respirazione

2. La scala di Barthel è uno strumento di valutazione:

- a) dell'autonomia nella attività di vita quotidiane (ADL)
- b) del rischio di caduta
- c) del rischio di infezione della ferita chirurgica
- d) del rischio di malnutrizione

3. La procedura per eseguire un tampone rino- faringeo in un paziente adulto Covid positivo, prevede:

- a) di inserire per circa 2- 3 cm il tampone orientandolo verso il rinofaringe in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe
- b) di inserire per circa 6-8 cm il tampone orientandolo verso l'orofaringe e in modo da raggiungere la parte posteriore dell'orofaringe
- c) di inserire per circa 6-8 cm il tampone orientandolo verso il rinofaringe in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe
- d) di inserire per circa 2- 3 cm il tampone orientandolo verso l'orofaringe e in modo da raggiungere la parte posteriore dell'orofaringe

4. Per *dolore cronico* si intende:

- a) un dolore persistente di durata superiore ai 3/ 6 mesi
- b) un aumento transitorio dell'intensità del dolore in un paziente con dolore di base ben controllato
- c) un dolore di intensità superiore a 8/10 (scala NRS) associato a patologia oncologica
- d) tutte le precedenti

5. Il valore normale del PH ematico è:

- a) 7,35 – 7,45
- b) 7,00 – 7,25
- c) 6,50 – 7,50
- d) 7,15 – 7,35

6. Le *linee guida* NICE, nel periodo preoperatorio raccomandano:

- a) di eseguire la doccia con prodotti antisettici e disinfettanti
- b) di eseguire la doccia con semplice sapone
- c) di non eseguire la doccia
- d) di eseguire la doccia con prodotti antimicrobici

7. Le azioni educative rivolte alle persone sane, volte alla promozione dei corretti stili di vita appartengono alla prevenzione:

- a) primaria
- b) secondaria
- c) terziaria
- d) terapeutica

8. Il microgrammo (mcg) corrisponde:

- a) alla millesima parte del grammo
- b) alla centesima parte del grammo
- c) alla millesima parte del milligrammo
- d) alla centesima parte del milligrammo

9. La sostanza endogena che impedisce all'alveolo polmonare di collassare durante la fase espiratoria è:

- a) il surfactante
- b) il liquido pleurico
- c) il trasudato alveolo- capillare
- d) il liquido sinoviale

10. La *rettoraggia* è caratterizzata da:

- a) un sanguinamento del duodeno, digiuno e ileo
- b) un sanguinamento gastrico
- c) emissione di feci nere, di aspetto piceo e maleodoranti
- d) un sanguinamento del colon trasverso, discendente e retto

11. Il *midazolam* è un principio attivo utilizzato per il trattamento di:

- a) embolia polmonare
- b) ansia
- c) dermatite da contatto
- d) ipertensione arteriosa polmonare

12. Per infezione *nosocomiale* si intende:

- a) ogni infezione causata da un batterio multiresistente all'antibioticoterapia
- b) ogni infezione trasmissibile per via aerea
- c) ogni infezione trasmissibile per contatto
- d) ogni infezione acquisita in ospedale

13. Nei pazienti *disfagici* sono controindicati:

- a) cibi fibrosi e filamentosi
- b) cibi a temperatura simile a quella corporea
- c) cibi di consistenza omogenea
- d) cibi che richiedono una masticazione corta

14. Nella registrazione elettrocardiografica il complesso QRS corrisponde a:

- a) conduzione atrio- ventricolare
- b) depolarizzazione atriale
- c) ripolarizzazione atrio- ventricolare
- d) depolarizzazione ventricolare

15. I set utilizzati per l'infusione endovenosa di soluzioni lipidiche vanno sostituiti:

- a) ogni 72 ore
- b) ogni 12 ore
- c) ogni 24 ore
- d) ogni 96 ore

16. L' *Omeprazolo* è un principio attivo utilizzato per il trattamento di:

- a) ansia
- b) malattia da reflusso gastro- esofageo
- c) dermatite da contatto
- d) trombosi venosa profonda

17. Secondo la classificazione della ferita chirurgica (CDC, 1999; NICE, 2008) un intervento di mastectomia in elezione è classificato come:

- a) pulito
- b) pulito- contaminato
- c) contaminato
- d) sporco- infetto

18. L'approccio al paziente secondo l' algoritmo ABCDE prevede, in ordine, la valutazione di:

- a) vie aeree - respiro – circolo – stato neurologico – esame testa/ piedi
- b) stato di coscienza – sicurezza della scena – trauma – necessità di ossigenoterapia – dolore
- c) dolore – parametri vitali – frequenza respiratoria – espansione polmonare – stato di coscienza
- d) apertura degli occhi – risposta motoria – risposta verbale – risposta al dolore – parametri vitali

19. Per l'effettuazione di un'irrigazione vescicale continua a circuito chiuso è indicato l'utilizzo di:

- a) catetere vescicale a due vie o Foley
- b) catetere vescicale a tre vie o Dufour
- c) catetere vescicale con una punta a becco di flauto o Couveilaire
- d) catetere vescicale Mercier

20. In ambito sanitario l'acronimo PDTA identifica:

- a) Piano di Tutela Aziendale
- b) Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale
- c) Percorso di Terapia Acuta
- d) Protocollo di Trattamento Avanzato

21. Le maschere facciali con reservoir permettono l'erogazione di:

- a) una concentrazione di Ossigeno fino ad un massimo di 90%
- b) una concentrazione di Ossigeno fino ad un massimo di 45%
- c) una concentrazione di Ossigeno fino ad un massimo di 21%
- d) nessuna delle precedenti

22. Un BMI (Body Mass Index) di 29 è indice di un paziente:

- a) gravemente obeso
- b) gravemente sottopeso
- c) sottopeso
- d) sovrappeso

23. Lo stato di *coma* è definito da:

- a) un deficit della percezione e di pensiero coerente
- b) uno stato di alterazione dell'attenzione con disorientamento
- c) incapacità a mantenere uno stato di vigilanza in assenza di stimolazione esterne
- d) una condizione di non risvegliabilità a stimolazione verbale o dolorosa

24. L'anestesia generale è divisa in tre fasi:

- a) fase di iniezione, fase di supporto, fase di risveglio
- b) fase di induzione, fase di mantenimento, fase di risveglio
- c) fase di induzione, fase di supporto, fase di mantenimento
- d) fase di iniezione, fase di mantenimento, fase di risveglio

25. Le micosi cutanee sono affezioni cutanee causate da:

- a) funghi e favorite dall'alterazione del mantello idrolipidico epidermico
- b) batteri gram positivi
- c) batteri gram negativi
- d) batteri gram positivi e batteri gram negativi

26. Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il dolore acuto lieve deve essere inizialmente trattato con:

- a) agonisti oppioidi
- b) agonisti oppioidi e oppioidi di media potenza in associazione
- c) FANS in associazione a oppioidi di media potenza
- d) FANS o paracetamolo

27. La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) permette di:

- a) registrare e valutare l'attività elettrica nel muscolo
- b) valutare il sistema muscolo scheletrico tramite onde magnetiche
- c) valutare il sistema muscolo scheletrico tramite radiazioni ionizzanti
- d) visualizzare strutture ossee tramite raggi x

28. Le fasi del processo assistenziale sono:

- a) diagnosi clinica, diagnosi infermieristica, diagnosi strumentale e intervento
- b) accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione degli interventi e valutazione
- c) valutazione, programmazione, pianificazione e piano di assistenza
- d) prevenzione, accertamento, valutazione, pianificazione assistenziale e rivalutazione

29. Per *disartria* si intende:

- a) un difetto dell'articolazione della parola
- b) una difficoltà nella deglutizione
- c) una alterazione dello stato di coscienza
- d) una patologia dell'ultimo tratto gastro- intestinale

30. Con il termine *menarca* si intende:

- a) l'ultimo ciclo mestruale
- b) la manifestazione dolorosa associata al ciclo mestruale
- c) l'interruzione per 6 mesi o più del normale ciclo uterino
- d) il primo ciclo mestruale