

EDOCERE MEDICOS

Hunter W.

Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata, London, 1774

(Descrizione fisica 21 c., XXXIV c. di tav. : ill. : atl)

Biblioteca ospedale 1940

William Hunter (1718-1783)

L'Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata fu pubblicata a Birmingham da John Baskerville nel 1774 ed è corredata da trentaquattro tavole incise in rame in grandezza naturale. Si tratta di dissezioni anatomiche di utero gravido con didascalie in latino e inglese. L'autore ci si dedicò per quasi trent'anni avvalendosi di vari artisti e raggiungendo una chiarezza espositiva e una caratura artistica che fanno di quest'opera un esempio eccelso nell'editoria medica.



PROMOSSO DA:



Carlo Poma

Governo della Regione



Regione Lombardia

ASST Mantova

BIBLIOTECA



TIBERIANA

ASST



Mantova

MBAC



Mantova

MBAC - Mantova per il Basso



Mantova

IN COLLABORAZIONE CON:



Liceo Artistico

CON IL SOSTEGNO DI:



Ospedale di Mantova



A N A T O M I A
UTERI HUMANI GRAVIDI
TABULIS ILLUSTRATA.

AUCTORE

GULIELMO HUNTER,

SERENISSIMAE REGINAE CHARLOTTAE MEDICO EXTRAORDINARIO,
IN ACADEMIA REGALI ANATOMIAE PROFESSORE,
ET SOCIETATUM REGIAE ET ANTIQUARIAE SOCIO.

BIRMINGHAMIAE INCUBERAT JOANNES BASKERVILLE, MDCCLXXIV.

LONDINI PROSTANT APUD S. BAKER, T. CADELL, D. WILSON, G. NICOL, ET J. MURRAY.

T H E A N A T O M Y
OF THE
H U M A N G R A V I D U T E R U S
EXHIBITED IN FIGURES.



BY



W I L L I A M H U N T E R,

PHYSICIAN EXTRAORDINARY TO THE QUEEN, PROFESSOR OF
ANATOMY IN THE ROYAL ACADEMY, AND FELLOW OF THE
ROYAL AND ANTIQUARIAN SOCIETIES.

PRINTED AT BIRMINGHAM BY JOHN BASKERVILLE, 1774.

SOLD IN LONDON BY S. BAKER AND G. LEIGE, IN York-Street; T. CADELL IN THE Strand; D. WILSON AND G. NICOL,
OPPOSITE York-Buildings; AND J. MURRAY, IN Fleet-Street.



T O T H E K I N G.

S I R,

THIS work had no other claim to the honour with which it is distinguished by YOUR MAJESTY, than as it illustrates one part of science hitherto imperfectly understood, and as it contains the foundation of another part of science, on which the lives and happiness of millions must depend. It gave me an heart-felt satisfaction, to observe how much this consideration recommended it to ROYAL PATRONAGE.

When respect, reverence, and gratitude rise to a certain degree, and the occasion is public and solemn, the freedom of language is restrained: and I should be guilty of an abuse of that gracious condescension, with which I am honoured, were I to attempt to express by words the sentiments of my heart. But, for the sake of those, who, placed at a distance from the ROYAL PRESENCE, may be more able to serve the public, than I have been, let me be permitted to say, that, although to acquire knowledge, and to communicate it to others, has been the pleasure, the business, and the ambition of my life; yet, since I have had the honour to be a servant in YOUR ROYAL HOUSE, I have felt an additional incitement to assiduity, being convinced that an unremitting endeavour to be useful to society, is the readiest, and the most certain way to the favour of our SOVEREIGN.

That the peculiar blessing of this country, the influence of a KING who sincerely wishes to encourage every improvement, a KING who takes a part with all his subjects in their happiness, and in their distress, may be long preserved to us, is the fervent prayer of,

S I R,

Y O U R M A J E S T Y ' S



most faithful Subject,

and most dutiful Servant,

WILLIAM HUNTER.

TABULA I.

PLATE I.

DECIM priores tabulae rationem edebant, anno fere sex
vicesimali mense exstant, non, 1750, subito morte exstintum.
Arteriae et venae, circa dissectionem injectis, distabant. In hac
prima, contenta abdominis, integumentis decussatis incisus et re-
sectus, sub conspectum venit. Resumptum est a clavi fere ga-
lley, ut superior incisus pars hanc paulo altius elatior, et va-
tera inde ablatum clavis contentis obiecturatur.

Tenuior et pulchra, utpote partes extremae, cum, quam ceteris,
non minus non desiderant. Pulchra vero, in hoc cadavere, ut
ex figura conspici potest, aqua inter cutem intumescunt.

A A Pars anterior thoracis infra mammae, qua minus erat trans-
versis diffusis, lignum a parte superiori terminans.

B B Inguementis, musculo, et peritoneo decussatis incisus, eorum
anguli duo superiores in margines thoracis cartilagineos reflecti.

C C Eandem anguli duo inferiores, in inguen, foveae, et ossa
illius spinas arteriarum, utriusque reclinat. In angulo illi, ad
marginem inferiorum medio foveae oppositum, observari licet
partem rugosam et tendam, qua filum adhibuit lux, ea mente,
ut, angulo detento, uterque et partes vicinas manifestius appa-
rent.

D Incisionis longitudinalis, ad tendendum tendit a superiore
cartilagineo costiformis osse, extremitas superior.

E Ipsidem incisionis, ad lympham istum pueri, extremitas in-
ferior.

F Hepatis ligamentum falciforme, super faciem anteriorem musculo-
rum abdominalis, ad illius vascula hilarem, marginem inter lobum
et parvum, protrahitur.

G G Arteria et vasa epigastrica, in utroque musculorum angulis in-
ferioribus trans peritoneum sepe proiecimus.

H Flexus iubeus sinister, in parte sinistra regionis epigastricae, illius
in superficie, arterie quaedam parvae, ex substantia illius
glanulosa exstant, et in peritoneum quo vultum distulit, de-
lucatur.

I Omentum in regione epigastrica situm, intestinis tenuibus in-
cumbens. Vasa quavis circa vultu coloris impleta, ea partis an-
te omnia visus potuerunt.

K Omentum pars inferior et media, ab utero ante eleata, quae in
plethura aucta quae minus minus contracta parva et compressa.

L Omentum a latere dextro, post partem eam uteri, qua incipit
intra dextra descendens.

M Omentum quod in latere sinistro ante talem fallopianam, &c.
descendit, leonem positum, quo partes ea in conspectum pro-
ducunt.

N N Duo intestinorum terminum gyri, quoniam utriusque, maxime
autem inferior, omenti parte praedicta tech fuerunt.

O Uterus, regimini totum umbilicalem et hyogastricam posside-
re. Superficies ejus vasculis ramulis tenuibus intertextis: ha-
rum plerumque venae. Multa sanguine solummodo impleta,
indicare dotius afferunt, paulatim exstiterunt. Situs uteri paulo
obliquus, et ad latus dextrum. Umbilicus parte qua sit hac
lata aliquanto altior fuit. Forma uteri quodammodo irregu-
lari, aliae ejus partes aliis inaequales. Ad ex eo ostior, postea
quod visceribus vicinis incumbens, praeterea ad fundum, &
ad eam formam funderat, partem etiam quod contenta ejus for-
mam irregularem pra se volebant.

P Tumor ad latus sinistrum uteri, in ea facili: parte cui media
placenta interne adhaerebat.

Q Uteri tumor in latere dextro, ubi foris totus praebat, ubi
etiam foris per substantiam ejus fuit distulit in dextra fuit.
Undique circum hanc partem uteri aliquid depresso, et fac-
turi in illa aqua replent, tamen effluat.

R R Ligamenta rotunda. Sinistra, propter uteri suam obliquam,
dextro longius. Exitus anterior, angule inferioribus integu-
mentis hinc, filo distulit, in conspectum veniat. Quae line-
mentum in dextro, nihil aliud est, quam peritonei in forma theae
duplicatio et protrusio, ea ligamenta per paulum spatio sequens,
quaque ab eo peritonei processu, hinc spermaticam caus vel
tanti comitante, gressu tamen differt.

S S Tuae fallopianae. In latere dextro, filum fere nixae princi-
pium excurrere licet, parte reliqua post uterum descendens. In
latere sinistro, nixae media pars sola in conspectum venit, re-
gimen enim ejus arctius in medio illa posita, hincque ejus,
vel fundus, vasa spermatica occultant. Ea vasa, in latere sin-
istro, satis aperte conspiciuntur: ipsam illud totum inter lip-
pianam rotundam et talem occupant: vas parvum arteria; mag-
nam et altius venae. Utrique ad uteri latus, in peritoneum
duplicatione illa, qua ligamentum laevum appellatur, procedunt.

THE first ten plates were made from the dissection of a woman, who
died suddenly, in the end of her sixth month of pregnancy, in the year
1750. The arteries and the veins were injected with seas of different colours.

This plate represents the chest, as it appeared when the abdomen was
opened by a crucial incision, and the four angles of the containing parts
turned outwards: the subject being in its back, but so that the upper
part of the trunk was considerably higher than the rest.

The thighs and pubenda require no explanation: the latter of these
were denuded in the subject, as they appear in this figure.

A A The forepart of the chest, just below the breasts, where the trunk was
cut through, and which therefore terminates the figure above.

B B The two upper angles of the inguement, muscles, and peritoneum,
turned back over the cartilaginous margin of the chest.

C C The two inferior angles, turned down near the groin, thigh, and ante-
rior part of the os ilium, on each side. In each of these, at its lower
edge and opposite to the middle of the thigh, a part may be observed to
be stretched and puckered, where a thread was fixed, which pulled the
flap down, in order more fully to expose the womb and adjacent parts.

D The upper end of the longitudinal incision, at the pit of the stomach,
beginning just at the point of the costiform cartilage.

E The lower end of the same incision carried down to the lymphitis of the
os pubis.

F The umbilical or falciform ligament of the liver, which was spread out,
on the inside of the abdominal muscles, in the fissure between the great
and the small lobe of this viscus.

G G The epigastric artery and vein, projecting through the peritoneum,
upon each of the lower angles of the muscles.

H The small lobe of the liver, situated in the highest part of the epi-
gastric region. Upon its surface are represented some small arteries,
which emerge from the glanulosa substance, and are diffused in the peri-
toneum that covers it.

I The omentum, spread over the small intestines in the epigastric
region. The vessels of this part, too injected, were hardly visible, be-
ing covered by fat.

K The lower and middle part of the omentum, which had been pushed
up by the womb, and lay in numerous small folds pressed together.

L The omentum, in the right side, passing a little way down behind
that part of the womb from which the right tube begins.

M The omentum, in the left side, which came down before the fallopian
tube, &c. and which was thrown a little aside, that those parts might be
seen.

N N Two parts of the small intestines: both of which, but especially the
upper, were covered by the above-mentioned part of the omentum.

O The womb, possessing all the umbilical and epigastric regions. Its
surface is interspersed with a number of small vessels, the greater part of
which are veins. They were filled with blood only, and therefore gradu-
ally disappeared after the subject had been preserved some time. Its
situation is a little oblique, and towards the right side. The navel was a
little higher than the part upon which the uterus is placed. The form of
the womb is a little irregular, at some places projecting more than at
others. This formed partly owing to its being modelled upon the neigh-
bouring vessels, particularly at its fundus; and partly to its contents,
obscure.

P A swelling towards the left side of the womb, where the middle of
the placenta adhered.

Q A swelling on the right side of the womb, where the buttocks of the
child lay; and where the child could be felt, pretty distinctly, through
its substance. All around this part the womb was somewhat depressed,
and felt like a bag of water.

R R The round ligaments. The left is longer than the right, because of the
oblique situation of the womb. The exit of each was brought to view
by drawing down the lower angles of the inguement, &c. with threads,
and the appearance of a fissure there, was occasioned by a flesh-like
doubling and protrusion of the peritoneum around these ligaments:
this little way, which differs only in degree from that process of the
peritoneum, which accompanies the spermatic rope in a dog, or bull.

S S The fallopian tubes. In the right side, little more than the begin-
ning of the tube is seen: the rest running down behind the womb. Of
the left tube the middle part only is exposed: it beginning at the womb
being concealed by the fat which lies upon that part, and the end is
fimbriate being covered by the peritoneal vessels. These vessels are pretty
distinctly seen in the left side: they fill up all the space between the round
ligament and the tube: the small vessel is the artery, and the great,
in which that clings, is the vein: but of them are passing up in the tube of
the womb, in that doubling of the peritoneum called, the broad ligament.





TAB. III. Viscera eodem ablativis et separatis habere autem cum Diaphragmate in superioribus. Visceribus apparent in delineatione hinc figuræ
superioribus vultu fufca et parte lateris superioris oblique hinc vultu vultu fufca et parte lateris inferioris vultu vultu



T. 6. 1. (Hic) pars anterior et latera media crura et subtrochanterica in medio expansa et in antitrochanterico effusa. Hic pars subcruralis et paracranialis distincta et flaccida, cum in medio crura et subtrochanterica effusa et antitrochanterica effusa, in antitrochanterico effusa et subcruralis effusa. Hic pars lateralis et paracranialis distincta et flaccida, cum in medio crura et subtrochanterica effusa et antitrochanterica effusa, in antitrochanterico effusa et subcruralis effusa.



TAB. VI. Fetus in utero, prout a natura posuit, manifestis omnino parte uteri anteriori
in Placenta, & adhærente.

Ed. N. A. 1784. H. 1784.



TAB. VII. Salinis, Crataegus, pascuaria, et nigropurpurea, interius et peridermis membranis, una altera castoreo.
— Crataegus, salinis, et pascuaria, interius et peridermis membranis, una altera castoreo.



TAF. II. *Massa erectis perianthum* spicata dicitur hoc lignum representat, prout quodpervenit, ubi, non tantum non aliquid profecto dicitur claudere partem
 sed hoc lignum prout se ad observandum prout in se habet, non se non solum, abinde apparet, subit 172.

[illegible]



T. A. B. XII. ad videndum quid præcedens multum exhibet spectant plerumque a parte posteriori uterum, cum vagina,
quæ sita sita, præterea infima. Hæc autem ad ostium apertum ostenduntur, illa quoque ostium ad præterea
ostium multum ostendunt, ut per, ad præterea ostium ostendunt, præterea ostium ostendunt ad

Sci. Nov. 1713. by J. W. K.



TAB. XIII. *Uterus cadaveris, nono graviditatis anno. Aperte. Uterus (Vagina et Cervix uterina integra) aditus, seduct, cum cum antea non Uterus pariete, ovariorum, et callositatibus, et in fundum Uteri reclinatus, utrumque uterum, quod hucusque non conspicitur, hinc Uteri, utriusque repleta.*


Pub. Nov. 1711. J. D. H.



TAB. XIV. Ovario Galavere, aere, itidem gravitatis mensur. Fasciculi fibrosi
 in parte interna uteri triplici figura exhibentur



TAB. XV. *De quibusdam Cisternis non ita communibus, quibusdamque systema arteriarum illarum quatuordecim figuris expressum. Fig. I. Cisterna illa magna, quae per arteriam
 duos Placentas adhaerens. Fig. II. Cisterna parva, quae arteriam percutit. Fig. III. Cisterna parva, quae arteriam percutit. Fig. IV. Cisterna parva, quae
 percutit. Fig. V. Cisterna parva, quae percutit.*



Uterus dext.

Uterus sinist.

*T. A. D. XVI. . A. scilicet Cadavere, octavo mense. Uterus a latere dextro raso, adipae ita
negligenter preparatus et scalpello anatomico demulatus, ut vasorum ad eum accedens,
cervicisque perne ramificationes quomodo clarescenti apparerent.*

Tab. Nova. 1717. P. H. H. H.



Figurae anatomicae
 TAB. XXV. Idem Uterus a fronte. Perim. sive externa, vel externa, sive interna, sive sublati, sive perim.
 phorum distributio, ceramque v. sive Placentam, quae hic parte exteriori et fovea Uteri adheret.
 * peripartus melius conspiciuntur.



J. J. Weyland delin.

W. H. Weyland sculp.

T. A. B. XVIII. Ipsa uteri fundus, eodem modo præparata, ut amplius videretur, et
 Venarum præsertim Placentæ et advesæ objectarum, frequentes inter se commixtione
 contemplanda præstarent



J. Van Roonwijck delin.

J. W. F. de Meijer sculp.

TAB. XIX. *Idem Uterus, ejus facie anteriori incisa et in Fundum revoluta, illius secundinis per
quas caput Fetus, Avascularis licet, videtur. Sic igitur visus esse offert cum, superficies externa Placentae
ad demulcentiam tam parvi, superficiei interna uteri, et respondens, una cum vasibus quae inter Uterum et
Placentam intercedunt. Partes Uteri extenses, et his lineamentis adhibitis expressae sunt.*



TAB. XX. Idem denovo Uterus sed omnino apertus, ut Fœtum in situ
 naturali ostendat. Circa Fundum quoque versus substantia tam
 Placenta quam Uteri incisa conspicitur.

Tab. Nov. 1711, 4, by Dr. Wistar.



TAB. XVI. 1. *Septimo cadavere, Septimo quicquidatis mensi. Aperte cruciformi incisione lieno & intestinis rite utinibus
per membranas, falcem continentes, totus ipse agnus mundanus conspicitur. Reliqua partes multi lineis distinctae sunt.*



*Tab. XIII. Pelvis Cadaveris Contentis Pelvis, quae soluta sponte sunt, ex duplici patet figura
 in illa elaboratione, dextro Pagina latere depicta & descripta. Os illud in conspectum prodit.
 Pl. N. 12. 1772. by Dr. Hunter.*



J. G. Wandelaar del.

Wandelaar sculp.

*TAB. XXIII. Octavum Cadaver, sexto Gestationis mense. Uteri ac membranarum parte
anteriori sublata, exhibetur Fœtus cum parte Placentæ et Funiculi umbilicalis.*

Uteri Vasa cerâ impleta erant.

Fœtus Nov. 1772, æt. Dr. Hunter.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



TAB. XXV. In ordine Cadaveri. Fig. I. Placenta, rursus et postea illi parti adhærens, solutis, qui
 quædam ingit per eam, uterum et tempore. Fig. II. Placenta transverse, ut, et solutis
 qui quædam ingit per eam, uterum et tempore. Fig. III. Placenta, uterum et tempore. Fig. IV. Placenta, uterum et tempore.



TAB. XXV. . *Visum cadaver, quando vivens, Apertus emicuit Uterus, ac Fetus inde exemptus, quo subtilius
 judicium feratur de Fetus ipso, de partibus quæ secum invicem comparandis et dimensionibus, nec non de conditione
 Cervicis Uterinae quæ sub hoc tempore obtinet.*

J. V. H. Sculpsit.


W. H. Sculpsit.



112



22

[illegible]



*TAB. XXX. Placenta calvera, parte interna dextra. Placenta a parte interna aperta, vasa sunt repleta.
 Proprie de interna vasa sunt repleta. Placenta interna, Vasa in Placenta et in Membrano sunt repleta.
 Cuiusmodi interna vasa, quae ad, et a parte interna Placenta et in Membrano sunt repleta, quae sunt repleta.*

Fig. I.



Fig. II.



Fig. II.



TAB. XXI. *Visus figura ab eodem Cadavere. Fig. I. Mentes a parte posteriori ita aperta, ut. Tunc Membrana Ductus externi in salis. Cervix uterina vasa appendice*

Fig. II. *Parte postica illius membranaeque Ductus sublati. Vetusque per pellucidus membranas apparet. Fig. III. Chorum apertum Corporis. Lutei uterini ostendit*



J. S. Edwards del.

J. H. Smith sculp.

TAB. XXXIII. Una pars abortu perdis, in figura expressa. Fig. I. Conceptus accretus, acriter holo-machosus, in parte quae tota mater
 transiens est vultu obpata. Fig. II. Quasiem accretus, acriter holo-machosus. Fig. III. Conceptus alter post octo fore holo-machosus. Fig. IV.
 Idem conceptus ad aramen paulo carnosius reconvales. Fig. V. Chorion nudum, i. e. ab ambiente Placenta expeditum.

Fig. VI. Idem conceptus apertus.

Publ. Nov. 12. 1774. by Dr. Hunter.



TAB. XXXIV. Fig. I. *Conspicua, quanta carcer hebdomada, nempe ibi cum cunctis suis contentis.* Fig. II. *Idem conspicua cum*
quillo amplificato, ibi parte anteriori amissa, et cunctis Embrionem continente in latera effuso. Fig. III. *Conspicua intus, quanta*
carcer hebdomada. Fig. IV. *Parte ipsam interiori, sectione a vertice ad unum ducta, post facto.* Fig. V. *Conspicua intus, cum*
pericoma, ibi ibi modo. Fig. VI. *Idem, parte anteriori sublata.* Fig. VII. VIII. IX. *Figurae Bandae fidei ibi, in gravidis, secundum longi-*
tudinem dissecit, utque hinc in primis ignoscitur. hebdomada, statim, quillo multo sublatior, cunctum est.